

ओभरडोजका जोखिम तत्त्वहरू तथा रोकथाम

ओपओइडमा दुवै अवैध फेन्टानाइल र हेरोइन साथसाथै पीडाको उपचार गर्नका लागि प्रयोग गरिने नरिधारित औषधहरू जस्तै मोर्फिन, कोडेन, मेथाडोन, अक्सीकोडोन (अक्सीकोनटिन, प्रकोडन, प्रकोसेट), हाइड्रोकोडोन (विकिडिन, लोरट्याब, नरको), फेन्टानाइल (ड्युगेसकि, फेन्टोरा), हाइड्रोमोर्फोन (डलाउडि, एक्जालगो) र बुपेनोर्फिन (सबुटेक्स, सुबोक्जोन) समावेश हुन्छन्। ओपओइड ओभरडोजका केही सामान्य जोखिम तत्त्वहरू साथसाथै केही रोकथाम रणनीतिहरू यसप्रकार छन्:

औषधहरू मसाउने

मानसिहरूले मदरि र/वा बेन्जोडाइजेपनिहरूमा हेरोइन वा नरिधारित ओपओइडहरू मसाउंदा धैरजसो ओभरडोजहरू हुने गर्छ। यी ओपओइड जस्ता पदार्थहरूले व्यक्तिको श्वासप्रश्वासको क्षमतालाई प्रभाव पार्ने हुँदा वशिषगरी मदरि र बेन्जोडाइजेपनिहरू (जानेक्स, क्लोनोपनि, एटभान र भ्यालाथिम) खतरनाक हुन्छन्। ओपओइडलाई अन्य औषधहरू वा मदरिसँग मसाउने नागनुहोस्। नरिदेशकले ओपओइड र बेन्जोडाइजेपनि नरिधारित गरेमा, नरिदेशित गरिएअनुसार मात्र प्रयोग गर्नुहोस्।

सहषिणुता

सहषिणुता भनेको औषधि प्रक्रिया गर्ने तपाईंको शरीरको क्षमता हो। सहषिणुता जतबिला पनि परिवर्तन हुन सक्छ त्यसैले तपाईंलाई यसका प्रभावहरू महसुस गर्नका लागि थप औषधि आवश्यक पर्न सक्छ। कसैले ओपओइडको प्रयोगबाट वशिषाम लिएमा सहषिणुता द्रुत रूपमा घट्न सक्छ। कसैले सहषिणुता गुमाउँछ र त्यसपछि फेरि ओपओइड लिन थाले भने, उनीहरूले वगितमा कुनै समस्या नहुनेगरी मात्रा प्रयोग गरे तापनि, उनीहरू ओभरडोजको जोखिममा हुन्छन्। तपाईंले मादक पदार्थ छोडेको समयावधिपिछि ओपओइडहरू प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, न्यून डोजबाट सुरु गर्नुहोस्।

शारीरिक स्वास्थ्य

तपाईंको शारीरिक स्वास्थ्यले ओपओइडहरू व्यवस्थित गर्ने तपाईंको शरीरको क्षमतालाई प्रभाव पार्छ। ओपओइडहरूले तपाईंको श्वासप्रश्वासको क्षमतालाई हानी पुर्याउन सक्ने भएकोले, तपाईंलाई दमरोग वा श्वासप्रश्वाससम्बन्धी अन्य समस्याहरू भएमा तपाईं ओभरडोजको उच्च जोखिममा हुनुहुन्छ। कलेजो (हेपाटाइटिस), मृगौलासम्बन्धी समस्याहरू भएका र HIV पोजेटिभ भएका व्यक्तहरू पनि ओभरडोजको बढ्दो जोखिममा हुन्छन्।

पछिल्लो ओभरडोज

वगितमा अघातक ओभरडोज अनुभव गरेका व्यक्तिलाई भविष्यमा घातक ओभरडोजको बढ्दो जोखिम हुन्छ। घातक ओभरडोज रोकका लागि, ओभरडोज कसरी पहिचान गर्ने र प्रतिक्रिया जनाउने भनी आफ्ना परिवार तथा साथीहरूलाई सिकाउनुहोस्।

कोही व्यक्तिले ओभरडोज लडिरहेको छ भने मैले कसरी थाहा पाउने?

कसैले आफ्नो शरीरले सम्हाल्न सक्ने क्षमताभन्दा बढी ओपओइड लिएमा, उनीहरू बेहोश हुन, श्वासप्रश्वास बन्द हुन र मृत्यु हुन सक्छ। ओपओइड ओभरडोज देखा पर्न केही मिनट वा घण्टा पनि लाग्न सक्छ।

ओभरडोज अनुभव गरिरहेको व्यक्तिलाई नमिन लक्षणहरू देखा पर्न सक्छन्:

- श्वासप्रश्वास ढलियो हुने (प्रत्येक पाँच सेकेण्डमा एक पटकभन्दा कम श्वासप्रश्वास हुने) वा बलिकुलै श्वासप्रश्वास नहुने।
- वान्ता हुने।
- अनुहार पहेँलो र चिसो हुने।
- ओठ, औँलाका नडहरू वा खुट्टाका नडहरू नीलो हुने।
- ढलियो, अस्थिर तरिकाले धड्कनि वा नधड्कनि।
- नदाउँदा वा झपकी लाँदा घुम्ने वा गर्जेको आवाजहरू आउने।
- तपाईंले व्यक्तिको नामले चिच्याउँदा वा नकलहरूले छातीको बीच भागमा रगड्दा कुनै प्रतिक्रिया नदनि।

ओभरडोज चिकित्सा आकस्मिक अवस्था हो!
9-1-1 मा तुरुन्तै फोन गर्नुहोस्



STATE OF
OHIO
BOARD OF PHARMACY

www.pharmacy.ohio.gov

ओभरडोज पहिचान र प्रतिक्रिया मार्गदर्शक



बरिमी र स्याहारकर्ताहरूका लागि
मार्गदर्शक

ओहायो राज्य फार्मेसी बोर्ड

Steven W. Schierholt

कार्यकारी नरिदेशक

नलक्सन के हो?

नलक्सन (नरक्यान) एक चिकित्सकले लेखनुपरने औषधि हो, जसले ओपिओइड औषधको अधिक मात्रा (ओभरडोज) बाट भएको प्रतिक्रियालाई उल्टाउन सक्छ। ओभरडोज भएका बेला प्रयोग गर्दा, नलक्सनले मस्तिष्कमा ओपिओइडका प्रभावहरूलाई रोकछ र श्वासप्रश्वासलाई प्रभावस्थामा ल्याउँछ। यसलाई मासपेशीमा सुई वा नाकमा छरिका (स्प्रे)का रूपमा पनि सकिन्छ।

नलक्सन दुरुपयोगको कुनै सम्भावना छैन। यदि ओपिओइडको ओभरडोजले असर नगरेका व्यक्तिलाई दियो भने यो हानिरहित हुन्छ। यदि ओपिओइडको ओभरडोजले असर गरेका व्यक्तिलाई नलक्सन प्रयोग गरियो भने यसले उक्त असरको प्रतिकारका लक्षणहरू उत्पन्न गर्नेछ। नलक्सनले गैर-ओपिओइड औषधिको कारणले गर्दा भएका ओभरडोजहरूको प्रतिक्रियालाई उल्टाउँदैन।

महत्त्वपूर्ण: नलक्सनलाई कोठाको तापक्रममा प्रकाश नपर्ने ठाउँमा भण्डारण गर्नुपर्छ। नलक्सन कम तापक्रममा जमनसक्छ। यसो भयो भने औषधिले उद्देश्यअनुरूप काम नगर्न सक्छ।

मद्दत कहाँबाट पाउने

988 SUICIDE & CRISIS
LIFELINE

ओहायो मानसिक स्वास्थ्य तथा व्यसन सेवा
वर्षाको उपचार सफारसि फोन सम्पर्क
(सोमवारदेखि शुक्रवार बहिन ८ बजेदेखि बेलुकी
६ बजेसम्म)

१.८७७.२७५.६३६४ (1.877.275.6364)

RecoveryOhio - मद्दत कसरी प्राप्त गर्ने
www.pharmacy.ohio.gov/GetHelp

लागुऔषध दुर्व्यसन तथा मानसिक स्वास्थ्य सेवा
प्रशासनको उपचार स्थान पत्तालगाउने
<https://findtreatment.gov/a>

ओभरडोज हुँदा कसरी प्रतिक्रिया जनाउने

१. उक्त व्यक्तिलाई उहाँको नामले चियाएर र औँलाको जोरनीहरूले छातीको बीच भागमा रगडेर (जसलाई sternum rub भनिन्छ) ब्युँझाउने प्रयास गर्नुहोस्।

२. ९.१.१ (9.1.1) मा फोन गर्नुहोस्। उक्त व्यक्तिले सास फेर्न बन्द गर्नुभयो वा उहाँलाई सास फेर्न गाह्रो भइरहेको छ भन्ने कुरा बताउनुहोस्।

३. व्यक्तिको मुखमा सास रोकन सक्ने कुनै पनि चीज छैन भन्ने सुनिश्चित गर्नुहोस्। श्वासप्रश्वास रोकिएको छ वा निकै सुस्त छ भने उद्धार श्वासप्रश्वास (rescue breathing) थाल्नुहोस्।

४. उद्धार श्वासप्रश्वास दानिहोस्

चरण १: उहाँको टाउकोलाई पछाडि झुकाउनुहोस्, चिउँडोलाई उठाउनुहोस्, नाकलाई बन्द गर्न पोरा च्यापदिनुहोस्।

चरण २: हरेक ५ सेकेण्डमा १ पटक वसितारै श्वास दानिहोस्। व्यक्तिको छाती फुलाउनका लागि उहाँको फोक्सोमा पर्याप्त हावा दानिहोस्।

५. नलक्सन प्रयोग गर्नुहोस् र हरेक ५ सेकेण्डमा उद्धार श्वासप्रश्वास दानि जारी राख्नुहोस्।

६. यदि व्यक्तिले आफैँ श्वास फेर्न सुरु गर्नुभयो, उहाँको वान्ता नसर्कियोस् भन्नका लागि उहाँलाई कोल्तो पारेर राख्नुहोस्। एक मनिटमा १० भन्दा कम श्वासप्रश्वास भएमा उहाँहरूको श्वासप्रश्वास नरीक्षण गर्न र उद्धार श्वासप्रश्वास गर्न जारी राख्नुहोस्। वान्ता भएमा उहाँको मुख र नाकलाई हातैले सफा गर्नुहोस्।

७. यदि उक्त व्यक्तिले ब्युँझाउँदा, बोलाउँदा वा छुँदा कुनै पनि प्रतिक्रिया दानिभएन वा २-३ मनिटभित्र सामान्य रूपमा सास फेर्न थाल्नुभयो भने नलक्सनको अर्को खुराक दानिपर्छ।

८. EMS (आपात चिकित्सा सेवा) नआइपुग्दासम्म उक्त व्यक्तिसँगै रहनुहोस्।

*कृपया अरु नलक्सन सूत्रणहरू उपलब्ध भएकाबारे जानकारी रहनुहोस्। ओहायो कानूनले नलक्सनका सूत्रणहरू वितरण गरिएका बेला बरिमीहरू प्रशिक्षित हुनुपर्ने अनिवार्य गरेको छ। यो प्रचीमा नलक्सनको सूत्रण वितरण गर्ने कार्य सूचीबद्ध गरिएको छैन भने औषधविद्हरूले पूरक प्रशिक्षण सामग्रीहरू प्रदान गर्नुपर्छ।

नलक्सन कसरी दानि*:


NARCAN™ (4MG) र Kloxxado™ (8MG)

नेजल स्प्रे (नाकमा हाल्ने छरिका औषधि)

१. नेजल स्प्रे खोलन दुपपो (ट्याब) हटाउनुहोस्।

२. ठेल्दा भित्र जाने भाग

(पलनजर) को तल्लो पट्टा बूढी औँलाले र नाकमा पसने भाग (नेजल)को कुनै एउटा छेउमा चोरी औँला र बीचको औँलाले उक्त यन्त्र समातनुहोस्। तपाईं खुराक दानि तयार नहुँदासम्म कुनै पनि दबाव नदनुहोस्।



३. उक्त व्यक्तिको टाउको पछाडितिर झुकाउनुहोस् र तपाईंको हातले घाँटीको तलबाट आड दानिहोस्। नेजलको कुनै एउटा छेउमा तपाईंका औँलाहरू व्यक्तिको नाकको तल नहुँदासम्म एउटा नाकको प्वालमा नेजलको दुपपो बसितारै पसाउनुहोस्।

४. औषधिको खुराक दानि पलनजरलाई वसितारै ठेल्नुहोस्। खुराक दानिसकेपछि नाकको प्वालबाट उक्त यन्त्र हटाउनुहोस्।

५. २ देखि ३ मनिटपछि पनि उक्त व्यक्तिले कुनै पनि प्रतिक्रिया जनाउनुभएन भने अर्को नाकको प्वालमा थप खुराक दानिहोस्।

उत्पादकका निर्देशनहरूको एक प्रति पाउन नमिन वेबसाइटमा जानुहोस्:

www.pharmacy.ohio.gov/NARnasal (NARCAN)

www.pharmacy.ohio.gov/KLONasal (Kloxxado)

ZIMHI™ (Naloxone HCl) सुई

१. सुईको ढक्कन घुमाएर खोलसिकेपछि बाहिरि तिघरामा सुइरो घोचनुहोस्।

२. पलनजरले कटिकि आवाज ननकिलेसम्म त्यसलाई थचिनुहोस् र सुई हटाउनुअघि त्यसलाई २ सेकेण्डसम्म समात राख्नुहोस्। यदि पलनजर पूरण रूपमा तलैसम्म थचिएको छ र त्यसले औषधि देखिन भागलाई छेकेको छ भने सही तरिकाले खुराक दानिएको छ भन्ने मानिन्छ। सुईमार्फत खुराक दानिसकेपछि पनि अधिकांश औषधि सुईमै रहनु सामान्य कुरा हो।

३. एक हातका औँलाहरूले सुइरोको पछाडिपट्टा समातेर सुइरो अङ्गे भाग (सेफ्टी गार्ड) तलतिर तान्नुहोस्। तपाईंले सुई लगाइसक्ने बत्तिके यसो गर्नुहोस्।

४. प्रयोग गरिसकेपछि सुई नीलो खोलमा राखेर बन्द गर्नुहोस्। २ देखि ३ मनिटपछि पनि उक्त व्यक्तिले कुनै पनि प्रतिक्रिया जनाउनुभएन भने नयाँ यन्त्र प्रयोग गरेर थप खुराक दानिहोस्।

उत्पादकका निर्देशनहरूको एक प्रति पाउन

नमिन वेबसाइटमा जानुहोस्: www.pharmacy.ohio.gov/KLONasal