

CÓMO ANALIZAR SUS DROGAS

UTILIZACIÓN DE TIRAS REACTIVAS DE FENTANILO

1. Coloque las drogas que va a analizar en un recipiente pequeño y sin usar.

Cuanta más cantidad de droga analice, más confiables serán los resultados.

2. Agregue agua a las drogas y mézclelas.

Para 10 miligramos (mg) de:

- **metanfetamina, MDMA y éxtasis**, utilice una cucharadita de agua.
- Para otras drogas, **como la heroína, la cocaína, el crack, la ketamina y las píldoras de origen no médico**, utilice media cucharadita de agua.

10 mg son suficientes para cubrir el pelo de Abraham Lincoln en una moneda de centavo o llenar la lente de un microscopio estándar.

1 cucharadita contiene tanta cantidad de líquido como la tapa de una botella de refresco o agua.



Consejos para analizar sus drogas:

- No utilice las tiras reactivas más de una vez.
- Triture finamente **las pastillas y los comprimidos**, agregue agua al polvo y mezcle bien. Si no quiere analizar toda la pastilla, pártala por la mitad y analice una porción del centro.


3. Coloque la tira reactiva en el agua durante 15 segundos.

Sujete la tira reactiva por el extremo azul sólido e introduzca el extremo ondulado en el agua durante 15 segundos.

Las instrucciones continúan al dorso




UTILIZACIÓN DE TIRAS REACTIVAS DE FENTANILO



4. Coloque la tira en posición horizontal y espere 5 minutos.

Después de esperar **al menos 5 minutos**, mire la tira a plena luz. No intente leer los resultados después de 10 minutos.



5. Cómo leer los resultados.

Prueba de detección positiva: Si no tiene previsto consumir fentanilo, evite el consumo de drogas o comience de a poco.



Prueba de detección negativa: Recuerde que ninguna prueba es precisa al 100 %, y que las drogas aún pueden contener fentanilo.



Prueba no válida: Vuelva a analizar las drogas con una nueva tira reactiva.



¿Qué más puedo hacer para reducir el riesgo de sobredosis?

Ninguna droga es completamente segura y siempre existe algún riesgo de sobredosis. Intente seguir los siguientes consejos:

- **Consuma drogas con otras personas**, por turnos, y evite compartir agujas y otros dispositivos.
- **Vaya despacio**, tome pequeñas cantidades y espere entre toma y toma.
- Consiga **naloxona** y úsela en caso de sobredosis. La naloxona se puede adquirir en su farmacia local o se puede obtener de manera gratuita a través del correo visitando: **naloxone.ohio.gov**
- **Comuníquese al 988:** Si usted o alguien que conoce está experimentando una crisis relacionada con la salud mental o la adicción que no pone en riesgo la vida (pensamientos suicidas, angustia emocional o consumo/adicción de sustancias), **llame, hable por chat o envíe un mensaje de texto al 988** para recibir ayuda confidencial gratuita las 24 horas del día, los 7 días de la semana.