

## ओभरडोजका जोखिम तत्त्वहरू तथा रोकथाम

ओपओइडमा दुवै अवैध फेन्टानाइल र हेरोइन साथसाथै पीडाको उपचार गर्नका लागि प्रयोग गरिने नरिधारित औषधहरू जस्तै मोर्फिन, कोडेन, मेथाडोन, अक्सीकोडोन (अक्सीकोनटिन, प्रकोडन, प्रकोसेट), हाइड्रोकोडोन (विकोडिन, लोरट्याब, नरको), फेन्टानाइल (ड्युरेगसिक, फेन्टोरा), हाइड्रोमोर्फोन (डलाउडि, एक्जालगो) र बुपेनोर्फिन (सबुटेक्स, सुबोक्जोन) समावेश हुन्छन्। ओपओइड ओभरडोजका केही सामान्य जोखिम तत्त्वहरू साथसाथै केही रोकथाम गणनीतहरू यसप्रकार छन्:

### औषधहरू मसाउने

मानसिहरूले मदरि र/वा बेन्जोडाइजेपनिहरूमा हेरोइन वा नरिधारित ओपओइडहरू मसाउंदा धैरजसो ओभरडोजहरू हुने गर्छ। यी ओपओइड जस्ता पदार्थहरूले व्यक्तिको श्वासप्रश्वासको क्षमतालाई प्रभाव पार्ने हुँदा वशिषगरी मदरि र बेन्जोडाइजेपनिहरू (जानेक्स, क्लोनोपनि, एटभान र भ्यालाथिम) खतरनाक हुन्छन्। ओपओइडलाई अन्य औषधहरू वा मदरिसँग मसाउने नागनुहोस्। नरिदेशकले ओपओइड र बेन्जोडाइजेपनि नरिधारित गरेमा, नरिदेशित गरिएअनुसार मात्र प्रयोग गर्नुहोस्।

### सहषिणुता

सहषिणुता भनेको औषधि प्रक्रिया गर्ने तपाईंको शरीरको क्षमता हो। सहषिणुता जतबिला पनि परिवर्तन हुन सक्छ त्यसैले तपाईंलाई यसका प्रभावहरू महसुस गर्नका लागि थप औषधि आवश्यक पर्न सक्छ। कसैले ओपओइडको प्रयोगबाट वशिषाम लपिमा सहषिणुता द्युत रूपमा घटन सक्छ। कसैले सहषिणुता गुमाउँछ र त्यसपछि फेरि ओपओइड लनिछ भने, उनीहरूले वगितमा कुनै समस्या नहुनेगरी मात्रा प्रयोग गरे तापनि, उनीहरू ओभरडोजको जोखिममा हुन्छन्। तपाईंले मादक पदार्थ छोडेको समयावधिपिछ ओपओइडहरू प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, न्यून डोजबाट सुरु गर्नुहोस्।

### शारीरिक स्वास्थ्य

तपाईंको शारीरिक स्वास्थ्यले ओपओइडहरू व्यवस्थित गर्ने तपाईंको शरीरको क्षमतालाई प्रभाव पार्छ। ओपओइडहरूले तपाईंको श्वासप्रश्वासको क्षमतालाई हानी पुर्याउन सक्ने भएकोले, तपाईंलाई दमरोग वा श्वासप्रश्वाससम्बन्धी अन्य समस्याहरू भएमा तपाईं ओभरडोजको उच्च जोखिममा हुनुहुन्छ। कलेजो (हेपाटाइटिस), मृगौलासम्बन्धी समस्याहरू भएका र HIV पोजेटिभ भएका व्यक्तहरू पनि ओभरडोजको बढ्दो जोखिममा हुन्छन्।

### पछिल्लो ओभरडोज

वगितमा अघातक ओभरडोज अनुभव गरेका व्यक्तिलाई भवषियमा घातक ओभरडोजको बढ्दो जोखिम हुन्छ। घातक ओभरडोज रोकका लागि, ओभरडोज कसरी पहिचान गर्ने र प्रतकि्रया जनाउने भनी आफ्ना परिवार तथा साथीहरूलाई सिकाउनुहोस्।

## कोही व्यक्तिले ओभरडोज लडिरहेको छ भने मैले कसरी थाहा पाउने?

कसैले आफ्नो शरीरले सम्हाल्न सक्ने क्षमताभन्दा बढी ओपओइड लपिमा, उनीहरू बेहोश हुन, श्वासप्रश्वास बन्द हुन र मृत्यु हुन सक्छ। ओपओइड ओभरडोज देखा पर्न केही मिनट वा घण्टा पनि लाग्न सक्छ।

ओभरडोज अनुभव गरिरहेको व्यक्तिलाि नमिन लक्षणहरू देखा पर्न सक्छन्:

- श्वासप्रश्वास ढलियो हुने (प्रत्यक पाँच सेकेण्डमा एक पटकभन्दा कम श्वासप्रश्वास हुने) वा बलिकुलै श्वासप्रश्वास नहुने।
- वान्ता हुने।
- अनुहार पहेँलो र चसियो हुने।
- ओठ, औँलाका नडहरू वा खुट्टाका नडहरू नीलो हुने।
- ढलियो, अस्थिर तरकाले धड्कनि वा नधड्कनि।
- नदाउँदा वा झपकी लाँदा घुस्ने वा गर्जेको आवाजहरू आउने।
- तपाईंले व्यक्तिको नामले चर्च्याउँदा वा नकलहरूले छातीको बीच भागमा रगड्दा कुनै प्रतकि्रया नदनि।

ओभरडोज चकितिसा आकस्मिक अवस्था हो!  
9-1-1 मा तुरुन्तै फोन गर्नुहोस्



STATE OF  
OHIO  
BOARD OF PHARMACY

[www.pharmacy.ohio.gov](http://www.pharmacy.ohio.gov)

## ओभरडोज पहिचान र प्रतकि्रया मार्गदर्शक



बरिमी र स्याहारकर्ताहरूका लागि  
मार्गदर्शक

ओहायो राज्य फार्मेसी बोर्ड

Steven W. Schierholt

कार्यकारी नरिदेशक

## नालोकजोन भनेको के हो?

नालोकजोन (नरकान) एक नरिधारति औषधि हो जसले ओपिओइड औषधिका कारणले गर्दा भएको ओभरडोजको प्रतिक्रियालाई उल्टाउन सक्छ। ओभरडोज भएको बेलामा प्रयोग गर्दा, नालोकजोनले मस्तिष्कमा ओपिओइडका प्रभावहरूलाई बलक गर्छ र श्वासप्रश्वासलाई पूरवावस्थामा ल्याउँछ। यसलाई मांसपेशीमा सुई वा नाकमा स्प्रेको रूपमा दिन सकिन्छ।

नालोकजोनमा दुपयोगको कुनै सम्भावना छैन। ओपिओइड ओभरडोज अनुभव नगरेको व्यक्तिलाई दइएमा, यो हानरहित हुन्छ। ओपिओइड ओभरडोज अनुभव गरेको व्यक्तिलाई नालोकजोन प्रयोग गर्दा, यसले नसासम्बन्धी प्रतिक्रियाका लक्षणहरू उत्पन्न गर्ने छ। नालोकजोनले गैर-ओपिओइड औषधिका कारणले गर्दा भएका ओभरडोजहरूको प्रतिक्रियालाई उल्टाउँदैन।

**महत्त्वपूर्ण:** नालोकजोनलाई कोठाको तापक्रममा र प्रकाशदेखि टाढा भण्डार गर्नुपर्छ। नालोकजोन कम तापक्रममा फ्रिज हुन सक्छ। यसो भयो भने, इच्छा गरिए अनुसार औषधिले काम गर्ने छैन।

## ओभरडोज हुँदा कसरी प्रतिक्रिया जनाउने

1. व्यक्तिलाई उहाँको नामले चर्च्याए र नकलहरूले छातीको बीच भागमा रगडेर (स्टर्नम रब) जगाउने प्रयास गर्नुहोस्।
2. 9-1-1 मा फोन गर्नुहोस्। व्यक्तिले श्वास फेर्न छाड्नुभएको वा श्वास फेर्नमा कठिनाई भइरहेको भए सडकेत गर्नुहोस्।
3. व्यक्तिको मुखमा उहाँको श्वासप्रश्वास रोक्न सक्ने खालको केही वस्तु नभएको सुनिश्चित गर्नुहोस्। श्वासप्रश्वास रोकेको छ वा नकै सुस्त छ भने, उद्धार श्वासप्रश्वास सुरु गर्नुहोस्।
4. उद्धार श्वासप्रश्वास दिनुहोस्

**चरण 1:** उहाँहरूको टाउकोलाई पछाडी झुकाउनुहोस्, चिउँडोलाई

उठाउनुहोस्, नाकलाई बन्द गरेर पनिच गर्नुहोस्।

**चरण 2:** हरेक 5 सेकेण्डमा 1 पटक वसितारै श्वास दिनुहोस्। व्यक्तिको छाती फुलाउनका लागि उहाँको फोक्सोमा पर्याप्त हावा दिनुहोस्।

5. नालोकजोन प्रयोग गर्नुहोस् र प्रत्येक पाँच सेकेण्डमा एक पटक श्वास

दिएर उद्धार श्वासप्रश्वास जारी राख्नुहोस्।

6. व्यक्तिले आफैँ श्वास फेर्न सुरु गरेमा, उहाँहरूको वान्तामा अवरोध नहोस् भन्नका लागि उहाँलाई कोल्टो पारेर राख्नुहोस्। एक मिनटमा 10 भन्दा कम श्वासप्रश्वास भएमा उहाँहरूको श्वासप्रश्वास नरीक्षण गर्न र उद्धार श्वासप्रश्वास गर्न जारी राख्नुहोस्। वान्ता भएमा, उहाँहरूको मुख र नाकलाई हातैले सफा गर्नुहोस्।

7. जगाउँदा, आवाज दँदा वा छुँदा पनि व्यक्तिले प्रतिक्रिया नजनाएमा वा सामान्यतया श्वासप्रश्वास सुरु गरेमा, नालोकजोनको अर्को डोज दइनुपर्छ।

8. EMS नआइपुग्दासम्म उक्त व्यक्तिसँगै रहनुहोस्।

## नालोकजोन कसरी दिन\*#:

### नाकमा स्प्रे (NARCAN™ नसल स्प्रे) - 4MG

1. नाक स्प्रे खोलनका लागि गोले आकारमा भएको ट्याबलाई हटाउनुहोस्।
2. रेड प्लङ्जरको तल्लो भागमा बुढी औँलाले र नोजलको कुनै एउटा छेउमा चोरी औँला र बीचको औँलाले उक्त यन्त्र समातनुहोस्। तपाईं डोज दिनका लागि तयार नहुँदासम्म कुनै पनि दबाव नदिनुहोस्।
3. व्यक्तिको टाउकोलाई पछाडितिर



झुकाउनुहोस् र तपाईंको हातले घाँटीको तल सहायता प्रदान गर्नुहोस्। व्यक्तिको टाउकोलाई पछाडितिर झुकाउनुहोस् र तपाईंको हातले घाँटीको तल सहायता प्रदान गर्नुहोस्। नोजलको कुनै एउटा छेउमा तपाईंका औँलाहरू व्यक्तिको नाकको तल नहुँदासम्म एउटा नाकको प्वालमा नोजलको टपिलाई बसितारै घुसाउनुहोस्।

4. औषधिको डोज दिनका लागि रातो प्लङ्जरमा बसितारै थिच्नुहोस्। डोज दइसकेपछि नाकको प्वालबाट यन्त्र हटाउनुहोस्।

उत्पादकका निर्देशनहरूको पूर्ण प्रतिलिपिका लागि, यहाँ जानुहोस्: [www.pharmacy.ohio.gov/NARnasal](http://www.pharmacy.ohio.gov/NARnasal)

### नाकमा स्प्रे (Kloxxado™ नसल स्प्रे) - 8MG

1. नाकको स्प्रे खोलनका लागि कालो त्रिकोण आकारमा भएको ट्याबलाई हटाउनुहोस्।
2. प्लङ्जरको तल्लो भागमा बुढी औँलाले र नोजलको कुनै एउटा छेउमा चोरी र बीचको औँलाले नाकको स्प्रे समातनुहोस्। तपाईं डोज दिनका लागि तयार नहुँदासम्म कुनै पनि दबाव नदिनुहोस्।
3. व्यक्तिको टाउकोलाई पछाडितिर



झुकाउनुहोस् र तपाईंको हातले घाँटीको तल सहायता प्रदान गर्नुहोस्। नोजलको कुनै एउटा छेउमा तपाईंका औँलाहरू व्यक्तिको नाकको तल नहुँदासम्म एउटा नाकको प्वालमा नोजलको टपिलाई बसितारै घुसाउनुहोस्।

4. औषधिको डोज दिनका लागि रातो प्लङ्जरमा बसितारै थिच्नुहोस्। डोज दइसकेपछि नाकको प्वालबाट यन्त्र हटाउनुहोस्।

उत्पादकका निर्देशनहरूको पूर्ण प्रतिलिपिका लागि, यहाँ जानुहोस्: [www.pharmacy.ohio.gov/KLOnasal](http://www.pharmacy.ohio.gov/KLOnasal)

## मद्दत कहाँ प्राप्त गर्ने

ओहायो मानसिक स्वास्थ्य तथा लत सेवा वभागको उपचार सफारसि लाइन (बहान 8 बजेदेखि बेलुकी 6 बजेसम्म, सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म)  
1-877-275-6364

RecoveryOhio - मद्दत कसरी प्राप्त गर्ने  
[www.pharmacy.ohio.gov/GetHelp](http://www.pharmacy.ohio.gov/GetHelp)

पदार्थ दुपयोग तथा मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रशासनको उपचार लोकेटर  
<https://findtreatment.gov/>